

Nettacin Collirio 0,3%

Collirio, soluzione
Netilmicina

Composizione

Collirio multidose

100 ml contengono:

Principio attivo: Netilmicina solfato g 0,455 pari a Netilmicina g 0,300

Eccipienti: Sodio cloruro - Benzalconio cloruro - Acqua purificata

Collirio monodose

100 ml contengono:

Principio attivo: Netilmicina solfato g 0,455 pari a Netilmicina g 0,300

Eccipienti: Sodio cloruro - Acqua purificata

Forma farmaceutica e contenuto

Collirio, soluzione in flacone da 5 ml

Collirio, soluzione 15 contenitori monodose da 0,3 ml

Collirio, soluzione 20 contenitori monodose da 0,3 ml

Categoria farmacoterapeutica

La Netilmicina è un antibiotico aminoglicosidico.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento topico delle infezioni oculari esterne e degli annessi causate da germi sensibili alla Netilmicina, inclusi i germi produttori di enzimi adenilanti e fosforilanti.

Controindicazioni

Ipersensibilità verso i componenti del prodotto o verso altri aminoglicosidi.

Precauzioni d'impiego

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia.

Nella primissima infanzia e in gravidanza il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo medico. Si sconsiglia l'assunzione durante l'allattamento.

Il NETTACIN COLLIRIO non è iniettabile; pertanto non va iniettato per via sottocongiuntivale o introdotto in camera anteriore.

NETTACIN COLLIRIO contiene benzalconio cloruro: Benzalconio cloruro può essere assorbito dalle lenti a contatto morbide e può portare al cambiamento del loro colore. Tolga le lenti a contatto prima di usare questo medicinale e aspetti quindici minuti prima di riapplicarle; Benzalconio cloruro può anche causare irritazione agli occhi specialmente se ha l'occhio secco o disturbi alla cornea (lo strato trasparente più superficiale dell'occhio). Se prova una sensazione anomala all'occhio, di bruciore o dolore dopo aver usato questo medicinale, parli con il medico.

Interazioni farmacologiche

Non sono state segnalate significative interazioni farmacologiche con l'uso della Netilmicina in collirio.

La contemporanea somministrazione anche topica, specie se intracavitaria, di altri antibiotici potenzialmente nefrotossici ed ototossici può accrescere il rischio di tali effetti. È stato riferito un aumento della nefrotossicità potenziale di alcuni aminoglicosidi a seguito della somministrazione susseguente o contemporanea, che dovrebbe essere evitata, di altre sostanze potenzialmente nefrotossiche, quali cisplatino, polimixina B, colistina, viomicina, streptomicina, vancomicina, altri aminoglicosidi ed alcune cefalosporine (cefaloridina) o di diuretici potenti quali l'acido etacrinico e la furosemide, per le ripercussioni sul rene.

In vitro l'associazione di un aminoglicoside con un antibiotico betalattamico (penicilline o cefalosporine) può causare una reciproca e significativa inattivazione. Anche quando un antibiotico aminoglicosidico ed uno penicillino-simile sono stati somministrati attraverso due vie differenti, si è verificata una riduzione dell'emivita o dei livelli plasmatici dell'aminoglicoside in pazienti con insufficienza renale ed in alcuni pazienti con funzionalità renale normale.

Avvertenze speciali

L'uso prolungato di antibiotici topici può condurre alla crescita di microrganismi resistenti. Nel caso in cui, dopo un ragionevole periodo di tempo, non si ottenessero miglioramenti del quadro clinico o se si verificassero irritazioni o manifestazioni di ipersensibilità, occorre sospendere il trattamento e ricorrere ad una terapia adeguata.

Dose, modo e tempo di somministrazione

Instillare nel sacco congiuntivale una o due gocce di collirio 3 volte al dì o secondo prescrizione medica.

Prima dell'uso assicurarsi che il contenitore monodose sia intatto.

NETTACIN COLLIRIO monodose va usato solo immediatamente dopo l'apertura. L'eventuale residuo non deve essere riutilizzato.

Evitare che l'estremità del contenitore venga a contatto con l'occhio o con qualsiasi altra superficie.

Effetti indesiderati

Il NETTACIN COLLIRIO può determinare l'insorgenza di lievi e temporanee irritazioni oculari o fenomeni di ipersensibilità caratterizzati da edema, eruzioni orticarioidi e prurito.

Si chiede ai pazienti, qualora si verificassero effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo, di darne comunicazione al proprio medico o al farmacista.

Scadenza

Per la data di scadenza si rimanda alla confezione.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare a temperatura inferiore a 25 °C

NETTACIN COLLIRIO in confezione multidose non deve essere usato dopo 28 giorni dalla prima apertura.


NETTACIN COLLIRIO in confezione monodose va usato solo immediatamente dopo l'apertura. L'eventuale residuo non deve essere riutilizzato.

USO OFTALMICO

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI

Istruzioni per l'uso


Collirio multidose



Avvitare il tappo fino in fondo per perforare il flacone.



Svitare il tappo, capovolgere il flacone ed instillare esercitando una lieve pressione sullo stesso.



Richiudere il flacone avvitando il tappo fino in fondo.

Collirio monodose



Staccare la monodose dalla strip.



Aprire ruotando la parte superiore senza tirare.

Titolare A.I.C. nel paese di origine:

SIFI S.p.A. - Sede legale: Via Ercole Patti, 36 - 95025 Aci S. Antonio (CT)

Produttore:

SIFI S.p.A.

Officina di Aci S. Antonio (CT)

Importatore e titolare dell'Autorizzazione all'importazione Parallela in Italia:

GEKOFAR S.r.l. - Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano

Riconfezionato dall'officina indicata dalla lettera in prossimità del numero di lotto:

Ⓐ XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. - Via Amendola 1 - 20090 Calepio di Settala (MI)

Ⓒ S.C.F. S.r.l. - Via Federico Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO)

Ⓔ De Salute S.r.l. - Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR)

Tutti i marchi e i nomi commerciali di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari

Questo foglio è stato aggiornato a giugno 2020